

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель Министра  
Д.Л. Пиневич  
"06" *апр* 2019 г.  
Регистрационный № *013-0319*

## МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ УГРОЖАЮЩЕГО АБОРТА

инструкция по применению

### УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

Государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования"

### АВТОРЫ:

д.м.н., профессор Воскресенский С.Л., Тришина В.Л.

Минск, 2019

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТРЕРЖДАЮ  
Первый заместитель министра

\_\_\_\_\_ Д. Л. Пиневич  
06.03.2019  
Регистрационный № 013-0319

**МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ УГРОЖАЮЩЕГО АБОРТА**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ГУО «Белорусская медицинская академия  
последипломного образования»

АВТОРЫ: д-р мед. наук, проф. С. Л. Воскресенский, В. Л. Тришина

Минск 2019

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод лечения гестагенами угрожающего аборта (020.0) в I триместре беременности при низком уровне прогестерона в крови беременной.

Метод предназначен для использования в комплексе медицинских услуг врачами-акушерами-гинекологами организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и (или) амбулаторных условиях, и (или) в условиях дневного пребывания.

### **ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ**

При назначении лекарственных средств (дидрогестерона или микронизированного прогестерона) врачу-акушеру-гинекологу необходима информация о гормональной причине невынашивания и об уровне прогестерона в крови беременной.

### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Угрожающий аборт в I триместре беременности (020.0).

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Противопоказания, соответствующие таковым для медицинского применения лекарственных средств, необходимых для реализации метода, изложенного в настоящей инструкции.

### **ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА**

1. Определение уровня прогестерона в сыворотке крови беременных с угрожающим абортom (020.0) в I триместре беременности.

2. При сниженном уровне прогестерона в сыворотке крови беременных с угрожающим абортom (020.0) в I триместре беременности назначается гормональная терапия (дидрогестерон или микронизированный прогестерон). Уровни прогестерона, при которых назначается гормональная терапия:

5–6 недель — <22,8 нг/мл;

7–8 недель — <21,4 нг/мл;

9–10 недель — <28,5 нг/мл;

11–12 недель — <31,0 нг/мл.

### **ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

При выполнении данного метода ошибок не возникает.