

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Первый заместитель Министра



Д.Л. Пиневиц
2015г.

Регистрационный № 030-0515

**МЕТОД МЕСТНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ
ЛОЖА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ВО ВРЕМЯ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ**

Инструкция по применению

Учреждения разработчики: учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»; учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» г.Минска

Авторы: Жаворонок И.С., д.м.н., профессор Кондратенко Г.Г., Есепкин А.В., к.м.н., доцент Карман А.Д.

Минск, 2015

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра

_____ Д.Л. Пиневиц
07.05.2015
Регистрационный № 030-0515

**МЕТОД МЕСТНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ
ИЗ ЛОЖА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ: УО «Белорусский государственный медицинский университет», УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска

АВТОРЫ: И.С. Жаворонок, д-р мед. наук, проф. Г.Г. Кондратенко, А.В. Есепкин, канд. мед. наук, доц. А.Д. Карман

Минск 2015

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод местного гемостаза при кровотечении из ложа желчного пузыря во время холецистэктомии с использованием отечественного лекарственного средства Гамастат.

Настоящая инструкция предназначена для врачей-хирургов, иных врачей-специалистов хирургических отделений учреждений здравоохранения Республики Беларусь.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Оборудование

Общехирургические инструменты, стерильный перевязочный материал.

Лекарственное средство Гамастат, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Реактивы

Диагностические наборы для определения биохимических показателей крови, общего анализа крови, коагулограммы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Диффузные кровотечения из тканей ложа желчного пузыря, включая паренхиматозные геморагии из ткани печени во время холецистэктомии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Соответствующие таковым к применению Гамастата.

Артериальное и профузное венозное кровотечение.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

После холецистэктомии ложе желчного пузыря просушивается марлевым тампоном, затем к нему подводится салфетка, смоченная раствором Гамастата, и прижимается печеночным зеркалом на 1 мин. При этом гемостаз обеспечивается за счет двух компонентов — механической компрессии сосудистой сети и действия гемостатического средства на раневой поверхности. Остановка кровотечения сопровождается формированием фиксированного к раневой поверхности сгустка крови темно-коричневого цвета. При отсутствии полной остановки кровотечения необходимо без удаления плотно фиксированной к ложу темно-коричневой пленки повторно к источнику кровотечения подвести и прижать салфетку, смоченную раствором Гамастата.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможна повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам Гамастата. Никаких специфических мероприятий, за исключением обычного медицинского наблюдения не требуется.