

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель Министра

Е.Л. Богдан

« 22 » 07 2021 г.

Регистрационный № 089-0721

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЭМАЛИ И ДЕНТИНА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ

(инструкция по применению)

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: д.м.н., профессор Терехова Т.Н., к.м.н., доцент
Бутвиловский А.В.

Минск, 2021

В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен метод лечения кариеса эмали и дентина временных зубов, основанный на приостановлении кариозного процесса.

Применение метода позволяет остановить прогрессирование кариеса и избежать развития пульпитов и апикальных периодонтитов временных зубов, адаптировать детей к стоматологическому лечению, что в конечном итоге повышает качество оказания стоматологической помощи детям.

Настоящая инструкция предназначена для врачей-стоматологов, врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-стоматологов детских, иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в стационарных и (или) амбулаторных условиях, и (или) в отделениях дневного пребывания.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Кариес эмали временных зубов (K02.0 по МКБ-10).
2. Кариес дентина временных зубов (K02.1).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Пульпит (K04.0).
2. Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения (K04.4).
3. Хронический апикальный периодонтит (K04.5).
4. Иные противопоказания, соответствующие таковым для применения медицинских изделий и лекарственных средств, необходимых для реализации метода, изложенного в настоящей инструкции.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РЕАКТИВОВ И Т.Д.

1. Средства индивидуальной защиты (перчатки, маска, очки).
2. Набор стерильных стоматологических инструментов.
3. Щеточка и паста для снятия зубных отложений.
4. Стерильные ватные валики.
5. Слюноотсос.

6. 38% раствор фторида диамминсеребра.
7. Аппликатор.
8. 10% раствор повидон-йода.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

1. Информирование родителей о возможном возникновении окрашивания обработанных твердых тканей зуба, получение их письменного согласия.
2. Очищение зуба щеточкой и пастой.
3. Изоляция зуба от ротовой жидкости, высушивание.
4. Аппликация 38% раствора фторида диамминсеребра на пораженные кариесом твердые ткани зуба (0,03 мл).
5. Незамедлительное нанесение на ватном тампоне на пораженные кариесом твердые ткани зуба 10% раствора повидон-йода (1,1 мл).
6. Повторение процедуры каждые 6 месяцев.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ОШИБКИ

Таблица. Возможные осложнения при использовании метода

Осложнение	Причина	Медицинская профилактика возникновения
Аллергическая реакция на используемые материалы и лекарственные средства	Не полностью собранный анамнез	Тщательный сбор анамнеза
Прогрессирование кариеса	Попадание ротовой жидкости в кариозную полость при обработке твердых тканей зуба.	При проведении метода важно следить за изоляцией и сухостью операционного поля, что обеспечит взаимодействие между твердыми тканями зуба, растворами фторида диамминсеребра и повидон-йода.