

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра

_____ Р.А. Часнойть
13 февраля 2009 г.
Регистрационный № 214-1208

**ГИГИЕНА РТА В ПЕРИОДОНТОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СРЕДСТВА «АКВИН»**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: УО «Белорусский государственный
медицинский университет»

АВТОРЫ: д-р мед. наук, проф. Л.Н. Дедова, А.А. Витт

Минск 2009

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, ПРЕПАРАТОВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

1. Антисептическое средство «Аквин», отечественного производства, представляет собой готовый к применению раствор (активно действующим веществом которого является полигексаметиленгуанидин фосфат, 1 г на 100 г препарата), разрешенный для применения на слизистых оболочках (инструкция по применению в медицинской практике антисептика Аквин, Aquinum; утвержденный Министерством здравоохранения Республики Беларусь 30.03.2004).

2. Набор инструментов стоматологический.

3. Шприц с затупленной иглой.

Антисептическое средство «Аквин» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т. ч. микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида. По параметрам острой токсичности согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу и введении в желудок относится к 4 классу малоопасных соединений. Средство не раздражает слизистые оболочки глаза (инструкция по применению в медицинской практике антисептика Аквин, Aquinum; Министерством здравоохранения Республики Беларусь, 2002).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Профессиональная и индивидуальная гигиена рта при гингивите и болезнях периодонта (K05)

K05.0 Острый гингивит.

K05.1 Хронический гингивит.

K05.2 Острый периодонтит.

K05.3 Хронический периодонтит.

K06 Другие повреждения десны и беззубого альвеолярного гребня.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Противопоказанием может быть повышенная чувствительность к активному действующему веществу или компонентам средства.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

При применении средства «Аквин» побочных эффектов не выявлено.

Аквин хорошо переносится. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсibiliзирующие свойства в рекомендованных режимах применения у пациентов не выявлены.

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СРЕДСТВОМ «АКВИН» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГИГИЕНЫ РТА У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА

Аквин используют в индивидуальной и профессиональной гигиене рта.

Профессиональная гигиена: полоскание, орошение, инстилляція.

- Аквин используют перед проведением профессиональной гигиены: рекомендуется проводить полоскание ротовой полости (10 мл в течение 30 с).
 - Во время снятия зубных отложений обрабатываемую область орошают аквином каждые 15 мин из шприца в количестве 10 мл средства в течение 30 с.
 - После снятия зубных отложений рекомендовано использовать аквин в виде инстилляций зубодесневого кармана (0,1–0,3 мл).
- Индивидуальная гигиена:** полоскание.
- Для домашнего использования после чистки зубов рекомендовано полоскание аквином в количестве 10 мл в течение 30 с; 2 раза в день, курс применения 5 дней. Необходимость в повторных курсах определяется по показателям объективных тестов.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ИЛИ ОШИБКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При работе со средством «Аквин» следует избегать попадания в глаза. При случайном попадании на слизистую оболочку глаз их надо обильно промыть водой в течение 10–15 мин и закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцид).

При попадании средства в желудок рекомендуется обильное питье, промывание желудка водой комнатной температуры и прием адсорбентов (например, 10–15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды).